

FENTANILO:

Lo que usted debe saber



¿QUÉ ES EL FENTANILO?

- El fentanilo es un medicamento de receta que también se fabrica y se utiliza de forma ilegal.
- El fentanilo farmacéutico de receta se usa en cirugías o para tratar a pacientes con dolores intensos.
- La principal preocupación de salud pública es el fentanilo y los compuestos relacionados que han sido fabricados de forma ilegal.
- El fentanilo se puede fabricar o distribuir en diferentes formas, como en líquido o en polvo, lo que hace que sea más fácil mezclarlo con otras drogas, y hasta se puede prensar en pastillas falsas, que pueden parecer ansiolíticos u opioides de receta (vea la foto anterior).

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DEL FENTANILO?

- Según los CDC, más de 100 personas mueren cada día en los Estados Unidos por sobredosis de opioides sintéticos como el fentanilo. El fentanilo está relacionado con aproximadamente el 61% de las 80,000 muertes por sobredosis que ocurren cada año¹.
- El fentanilo es aproximadamente 50 veces más fuerte que la heroína, lo que significa que es más probable que cause una sobredosis.
- Se considera que aproximadamente 2 miligramos de fentanilo es una dosis letal.

Esto es apenas del tamaño de 5 a 7 granos de sal.

¿SABÍA QUE LA XILACINA, TAMBIÉN CONOCIDA COMO "TRANQ", CON FRECUENCIA SE MEZCLA CON OPIOIDES ILÍCITOS, INCLUIDO EL FENTANILO?

- En 2024, el 21% de las personas que dieron positivas para fentanilo también dieron positivas para xilacina².
- La presencia de xilacina y fentanilo en las drogas puede aumentar el riesgo de las personas de sufrir una sobredosis mortal. El consumo de xilacina también puede provocar úlceras, abscesos y complicaciones relacionadas.

1. National Center for Health Statistics (US) (December 2024). National Vital Statistics System. Los cálculos para 2024 se basan en datos provisionales. Los cálculos para 2015-2023 se basan en datos finales. Se accedió el 7 de julio de 2025 en https://www.cdc.gov/nchs/nvss/mortality_public_use_data.htm.

2. Millennium Health (February 2025). Shifting Tides: The Continued Evolution of the "Fourth Wave" of America's Overdose Crisis. Millennium Health Signals Report™, Volume 7. Se accedió el 2 de julio de 2025 en <https://www.millenniumhealth.com/news/signals-report-7/>.



CON FRECUENCIA,
EL FENTANILO
SE SUSTITUYE O
SE MEZCLA CON
OTRAS DROGAS Y
A MENUDO ESTO
OCURRE SIN QUE LA
PERSONA QUE LO
CONSUME LO SEPA.



RECURSOS
SOBRE EL
FENTANILO



Escanee para obtener
más información.

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE ESTA INFORMACIÓN PARA USTED?

- Actualmente, las sustancias que se venden en las redes sociales pueden contener fentanilo (conocido como "fent", "fetty", etc.) o xilacina (conocida como "tranq") sin que la persona lo sepa.
- Las sobredosis de fentanilo en los jóvenes están en aumento. En 2020, el 76% de las muertes por sobredosis de drogas en jóvenes de 14 a 23 años se relacionaron con el fentanilo.
- Entre 2019 y 2021, las muertes por sobredosis en adolescentes de 15 a 19 años aumentaron a más del doble. **El consumo de drogas en los adolescentes no aumentó, sino que el suministro de drogas se volvió más peligroso.**
- En 2023, 1,589 adolescentes de entre 15 y 19 años murieron por sobredosis. El fentanilo se relacionó con el 79% de estas muertes.
- El consumo de más de una droga al mismo tiempo se denomina policonsumo.** Mezclar drogas puede ser más peligroso que consumir una sola e incluso puede ser más mortal. Para obtener más información, visite <https://www.cdc.gov/stop-overdose/es/caring/datos-sobre-el-consumo-de-polisustancias.html>.
- Es casi imposible saber si las drogas contienen fentanilo o xilacina sin usar tiras reactivas u otros métodos para detectar drogas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los aditivos peligrosos se detectan con los métodos estándar de análisis de drogas.

CÓMO PUEDEN MANTENERSE SEGUROS USTED Y LOS DEMÁS?

- Una sobredosis puede afectar a cualquier persona. Puede ser aterrador, pero aprender sobre estas drogas y saber qué pasos debe tomar puede salvarle la vida a alguien.
- La naloxona (también conocida como **Narcan**) y el nalmefeno son medicamentos que pueden salvar vidas y revertir la sobredosis de opioides. Su uso es seguro incluso en ausencia de opioides.
- La naloxona es el único medicamento para revertir una sobredosis de opioides que viene en forma de aerosol nasal.
- Vea un video de YouTube sobre **cómo usar la naloxona:** <https://www.youtube.com/watch?v=2YvTcpOejes>
- Realice una prueba de detección de fentanilo con tiras reactivas**, que son tiras de papel que pueden indicar la presencia de fentanilo en otras drogas (cocaína, metanfetamina, heroína, etc.):
 - Se pueden hacer pruebas con pastillas, polvos e inyectables.
 - Reduce el riesgo de exposición accidental.
- La disponibilidad de las tiras reactivas de fentanilo varía según el estado.
 - Comuníquese con su departamento de salud o agencia de reducción de daños locales para obtener más información.
- Compruebe si hay síntomas de sobredosis.

CONOZCA LOS SIGNOS DE UNA SOBREDOSIS DE OPIOIDES. PUEDE SALVAR UNA VIDA.

PRESTE ATENCIÓN SI LA PERSONA:

- Tiene las pupilas pequeñas y contraídas ("pupilas puntiformes").
- Se queda dormida o pierde el conocimiento.
- Tiene la respiración lenta o débil o no respira.
- Hace sonidos de asfixia o de gorgoteo.
- Tiene el cuerpo flácido o sin vida.
- Tiene la piel descolorida (las uñas y los labios están azules o morados).

SALVE UNA VIDA DE UNA SOBREDOSIS POR OPIOIDES
[cdc.gov/rx-awareness/prevent](https://www.cdc.gov/rx-awareness/prevent) (en inglés)

SI CREE QUE ALGUIEN ESTÁ SUFRRIENDO UNA SOBREDOSIS DE DROGAS:

- Llame de inmediato al 911.
- Administre un medicamento para revertir la sobredosis, como naloxona o nalmefeno.
- Acueste de un lado a la persona para evitar que se ahogue.
- No deje sola a la persona hasta que llegue la ayuda médica.



RECURSOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS:

Para encontrar opciones de tratamiento y servicios cerca de usted, visite FindTreatment.gov/es, llame a la Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 800-662-4357 (800-662-HELP) o visite samhsa.gov/find-help/helplines/linea-nacional-ayuda.