

# FENTANILO:

## Lo que usted debe saber

**PASTILLAS AUTÉNTICAS**  
de oxycodona de 30 mg



**PASTILLAS FALSIFICADAS**  
de oxycodona de 30 mg  
que contienen fentanilo



Puede ser muy difícil distinguir los medicamentos falsificados de los auténticos.



Esto representa una dosis letal de fentanilo.

## ¿QUÉ ES EL FENTANILO?

- El fentanilo es un medicamento de receta que también se fabrica y se utiliza de forma ilegal.
- El fentanilo farmacéutico de receta se usa en cirugías o para tratar a pacientes con dolores intensos.
- La principal preocupación de salud pública es el fentanilo y los compuestos relacionados que han sido fabricados de forma ilegal.
- El fentanilo se puede fabricar o distribuir en diferentes formas, como en líquido o en polvo, lo que hace que sea más fácil mezclarlo con otras drogas, y hasta se puede pensar en pastillas falsas, que pueden parecer ansiolíticos u opioides de receta (vea la foto anterior).

## ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DEL FENTANILO?

- Según los CDC, más de 100 personas mueren cada día en los Estados Unidos por sobredosis de opioides sintéticos como el fentanilo. El fentanilo está relacionado con aproximadamente el 61% de las 80,000 muertes por sobredosis que ocurren cada año<sup>1</sup>.
- El fentanilo es aproximadamente 50 veces más fuerte que la heroína, lo que significa que es más probable que cause una sobredosis.
- Se considera que aproximadamente 2 miligramos de fentanilo es una dosis letal.

**Esto es apenas del tamaño de 5 a 7 granos de sal.**

## ¿SABÍA QUE LA XILACINA, TAMBIÉN CONOCIDA COMO "TRANQ", CON FRECUENCIA SE MEZCLA CON OPIOIDES ILÍCITOS, INCLUIDO EL FENTANILO?

- En 2024, el 21% de las personas que dieron positivas para fentanilo también dieron positivas para xilacina<sup>2</sup>.
- La presencia de xilacina y fentanilo en las drogas puede aumentar el riesgo de las personas de sufrir una sobredosis mortal. El consumo de xilacina también puede provocar úlceras, abscesos y complicaciones relacionadas.

1. National Center for Health Statistics (US) (December 2024). National Vital Statistics System. Los cálculos para 2024 se basan en datos provisionales. Los cálculos para 2015-2023 se basan en datos finales. Se accedió el 7 de julio de 2025 en [https://www.cdc.gov/nchs/nvss/mortality\\_public\\_use\\_data.htm](https://www.cdc.gov/nchs/nvss/mortality_public_use_data.htm).

2. Millennium Health (February 2025). Shifting Tides: The Continued Evolution of the "Fourth Wave" of America's Overdose Crisis. Millennium Health Signals Report™, Volume 7. Se accedió el 2 de julio de 2025 en <https://www.millenniumhealth.com/news/signals-report-7/>.



**CON FRECUENCIA, EL FENTANILO SE SUSTITUYE O SE MEZCLA CON OTRAS DROGAS Y A MENUDO ESTO OCURRE SIN QUE LA PERSONA QUE LO CONSUME LO SEPA.**



**RECURSOS SOBRE EL FENTANILO**



Escanee para obtener más información.

## ¿PORQUÉ ES IMPORTANTE ESTA INFORMACIÓN PARA USTED?

- Actualmente, las sustancias que se venden en las redes sociales pueden contener fentanilo (conocido como "fent", "fetty", etc.) o xilacina (conocida como "tranq") sin que la persona lo sepa.
- Las sobredosis de fentanilo en los jóvenes están en aumento. En 2020, el 76% de las muertes por sobredosis de drogas en jóvenes de 14 a 23 años se relacionaron con el fentanilo.
- Entre 2019 y 2021, las muertes por sobredosis en adolescentes de 15 a 19 años aumentaron a más del doble. **El consumo de drogas en los adolescentes no aumentó, sino que el suministro de drogas se volvió más peligroso.**
- En 2023, 1,589 adolescentes de entre 15 y 19 años murieron por sobredosis. El fentanilo se relacionó con el 79% de estas muertes.
- **El consumo de más de una droga al mismo tiempo se denomina policonsumo.** Mezclar drogas puede ser más peligroso que consumir una sola e incluso puede ser más mortal. Para obtener más información, visite <https://www.cdc.gov/stop-overdose/es/caring/datos-sobre-el-consumo-de-polisustancias.html>.
- Es casi imposible saber si las drogas contienen fentanilo o xilacina sin usar tiras reactivas u otros métodos para detectar drogas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los aditivos peligrosos se detectan con los métodos estándar de análisis de drogas.

## CÓMO PUEDEN MANTENERSE SEGUROS USTED Y LOS DEMÁS?

- Una sobredosis puede afectar a cualquier persona. Puede ser aterrador, pero aprender sobre estas drogas y saber qué pasos debe tomar puede salvarle la vida a alguien.
- La naloxona (también conocida como **Narcan**) y el nalmefeno son medicamentos que pueden salvar vidas y revertir la sobredosis de opioides. Su uso es seguro incluso en ausencia de opioides.
- La naloxona es el único medicamento para revertir una sobredosis de opioides que viene en forma de aerosol nasal.
- Vea un video de YouTube sobre **cómo usar la naloxona**: <https://www.youtube.com/watch?v=2YvTcPOejes>
- **Realice una prueba de detección de fentanilo con tiras reactivas**, que son tiras de papel que pueden indicar la presencia de fentanilo en otras drogas (cocaína, metanfetamina, heroína, etc.):
  - › Se pueden hacer pruebas con pastillas, polvos e inyectables.
  - › Reduce el riesgo de exposición accidental.
- La disponibilidad de las tiras reactivas de fentanilo varía según el estado.
  - › Comuníquese con su departamento de salud o agencia de reducción de daños locales para obtener más información.
- Compruebe si hay síntomas de sobredosis.

## CONOZCA LOS SIGNOS DE UNA SOBREDOSIS DE OPIOIDES. PUEDE SALVAR UNA VIDA.

### PRESTE ATENCIÓN SI LA PERSONA:

- › Tiene las pupilas pequeñas y contraídas ("pupilas puntiformes").
- › Se queda dormida o pierde el conocimiento.
- › Tiene la respiración lenta o débil o no respira.
- › Hace sonidos de asfixia o de gorgoteo.
- › Tiene el cuerpo flácido o sin vida.
- › Tiene la piel descolorida (las uñas y los labios están azules o morados).

### SI CREE QUE ALGUIEN ESTÁ SUFRIENDO UNA SOBREDOSIS DE DROGAS:

- › Llame de inmediato al 911.
- › Administre un medicamento para revertir la sobredosis, como naloxona o nalmefeno.
- › Acueste de un lado a la persona para evitar que se ahogue.
- › No deje sola a la persona hasta que llegue la ayuda médica.

**SALVE UNA VIDA DE UNA SOBREDOSIS POR OPIOIDES**  
[cdc.gov/rx-awareness/prevent](https://cdc.gov/rx-awareness/prevent) (en inglés)



## RECURSOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS:

Para encontrar opciones de tratamiento y servicios cerca de usted, visite [FindTreatment.gov/es](https://FindTreatment.gov/es), llame a la Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 800-662-4357 (800-662-HELP) o visite [samhsa.gov/find-help/helplines/linea-nacional-ayuda](https://samhsa.gov/find-help/helplines/linea-nacional-ayuda).